

Утверждаю 
 Заведующий отделением ДЦ
 ООО «ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА»
 ОП в г. Йошкар-Ола
 Зарубина О.А.

01.01.2025 г.

Критерии качества оказания медицинской помощи пациентам с ХБП 5 стадии на заместительной почечной терапии методом гемодиализа

Частота проведения диализа	не менее 3 раз в неделю
Недельное эффективное время диализа	не менее 720 мин/неделю
Доза диализа - Kt/V	≥ 1,4
Объем перфузии крови при гемодиализе	≥ 80 литров/сеанс или ≥ 240 л/неделю
Объем инфузии при гемодиализации	≥ 21 литра/сеанс или ≥ 63 л/неделю
Целевой уровень гемоглобина	100-120 г/л
Целевой уровень фосфора	≥ 0,8 ≤ 1,7 ммоль/л
Целевой уровень иПТГ	≥ 130 ≤ 585 пг/л
Целевой уровень скорректированного кальция	≥ 2,1 ≤ 2,4 ммоль/л
Целевой уровень альбумина	≥ 35 г/л
Целевой уровень калия крови	3,5 - 5,5 mEq/l
Целевой уровень натрия крови	125-140 mEq/l
Целевой уровень гидрокарбоната крови	20-24 mEq/l
Целевой уровень СРБ крови	≤ 20 mg/l
Вакцинация/ревакцинация от вирусного гепатита В	Титр anti-HbS ≥ 10
Уровень преддиализной гипергидратации	Менее 15 % от установленного сухого веса для мужчин Менее 13% для женщин
Целевые уровни АД до диализа	130-159/ 80-89 мм .рт.ст.
Строгое соблюдение диеты	Целевые показатели нутритивного статуса